

My Mental Health: Do I Need Help?

First, determine how much your symptoms interfere with your daily life.



Do I have mild symptoms that have lasted for less than 2 weeks?

- Feeling a little down
- Feeling down, but still able to do job, schoolwork, or housework
- Some trouble sleeping
- Feeling down, but still able to take care of yourself or take care of others



If so, here are some self-care activities that can help:

- Exercising (e.g., aerobics, yoga)
- Engaging in social contact (virtual or in person)
- Getting adequate sleep on a regular schedule
- Eating healthy
- Talking to a trusted friend or family member
- Practicing meditation, relaxation, and mindfulness

If the symptoms above do not improve or seem to be worsening despite self-care efforts, talk to your health care provider.



Do I have severe symptoms that have lasted 2 weeks or more?

- Difficulty sleeping
- Appetite changes that result in unwanted weight changes
- Struggling to get out of bed in the morning because of mood
- Difficulty concentrating
- Loss of interest in things you usually find enjoyable
- Unable to perform usual daily functions and responsibilities
- Thoughts of death or self-harm



Seek professional help:

- Psychotherapy (talk therapy)—virtual or in person; individual, group, or family
- Medications
- Brain stimulation therapies

For help finding treatment, visit [nimh.nih.gov/findhelp](https://www.nimh.nih.gov/findhelp).

If you are in crisis, call or text the 988 Suicide & Crisis Lifeline at 988 or chat at 988lifeline.org, or text the Crisis Text Line (text HELLO to 741741).



National Institute
of Mental Health

¿Necesito ayuda para mi salud mental?

Primero, determine hasta qué punto sus síntomas interfieren en su vida diaria.



¿Tengo síntomas leves que han durado menos de dos semanas?

- Se siente un poco decaído.
- Se siente decaído, pero aún puede trabajar, hacer tareas escolares o realizar labores domésticas.
- Tiene cierta dificultad para dormir.
- Se siente decaído, pero aún puede cuidarse a sí mismo o a otros.



Si es así, las siguientes son algunas actividades de autocuidado que pueden ayudarle:

- Hacer ejercicios (por ejemplo, aeróbicos o yoga).
- Participar en actividades que incluyan contacto social (ya sean virtuales o en persona).
- Dormir de forma adecuada, manteniendo un horario regular.
- Comer saludablemente.
- Hablar con un amigo o pariente en quien confía.
- Practicar actividades de meditación, relajamiento y contemplación.

Si los síntomas anteriores no mejoran o parece que están empeorando, a pesar de los esfuerzos de autocuidado, hable con su proveedor de atención médica.



¿Tengo síntomas graves que han durado dos semanas o más?

- Tiene dificultad para dormir.
- Hay cambios en su apetito que originan cambios no deseados en su peso.
- Tiene dificultad en las mañanas para levantarse de la cama debido a su estado de ánimo.
- Tiene dificultad para concentrarse.
- Ha perdido interés en cosas que por lo general le son divertidas.
- No puede realizar sus actividades y funciones diarias.
- Tiene pensamientos sobre la muerte o de hacerse daño.



Busque ayuda profesional:

- psicoterapia (terapia de diálogo), ya sea virtual o en persona, individual, grupal o familiar;
- medicamentos;
- terapias de estimulación cerebral.

Para ayudarle a encontrar tratamientos, visite la página de ayuda para enfermedades mentales: nimh.nih.gov/busqueayuda.

Si está en crisis, llame al 988 a la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. Si habla inglés, también puede enviar un mensaje de texto al 988 o usar su chat en vivo **988lifeline.org**. Además, puede comunicarse en inglés o español con la Línea de Mensajes de Texto en Tiempos de Crisis (**envíe AYUDA al 741741**).

